



PROSPECTO

Lea todo el prospecto detenidamente porque contiene información importante para usted.

Este medicamento puede obtenerse sin receta, para el tratamiento de afecciones menores sin la intervención de un médico. No obstante, debe usted utilizar con cuidado **GINKGO BILOBA BESCANSÁ** para obtener los mejores resultados.

Conserve este prospecto. Puede tener que volver a leerlo.

Si necesita información adicional o consejo, consulte a su farmacéutico.

Si los síntomas empeoran, persisten o no nota efecto después de 10 días, debe consultar a su médico.

En este prospecto se informa acerca de lo siguiente.

1. Qué es **GINKGO BILOBA BESCANSÁ** y para qué se utiliza
2. Antes de tomar **GINKGO BILOBA BESCANSÁ**
3. Cómo tomar **GINKGO BILOBA BESCANSÁ**.
4. Posibles efectos adversos.
5. Conservación del **GINKGO BILOBA BESCANSÁ**.

GINKGO BILOBA BESCANSÁ, Solución oral **Extracto seco estandarizado de *Ginkgo biloba L.***

El principio activo es el extracto seco estandarizado de hojas de *Ginkgo biloba L* (relación planta extracto 35-67:1), con un contenido de 24% de flavonoides expresados como glucósidos flavónicos 6% de lactonas terpénicas, de las que aproximadamente de un 2,8 a 3,4 % son ginkgólidos A, B y C, y de un 2,6 a 3,2 % es bilobalida.

Cada ml de solución oral contiene 40 mg de extracto de Ginkgo biloba y 475 mg de etanol 95 % v/v.

Los demás componentes son los excipientes: Sacarina sódica, Aroma de naranja, Aroma de limón, Agua purificada.

Titular y Responsable de la Fabricación:

Laboratorio R BESCANSÁ S.L.
Polígono Industrial del Tambre.
Vía Pasteur, 8
15890 Santiago de Compostela.

1. Qué es GINKGO BILOBA BESCANSÁ y para qué se utiliza

Es una solución oral. Se presenta en frasco de 50 ml.

Su actividad es la de vasodilatador cerebral y periférico. Mejora la microcirculación sanguínea. **GINKGO BILOBA BESCANSÁ** es para el alivio sintomático de los trastornos leves derivados de las alteraciones circulatorias, como vértigos y mareos o de las extremidades inferiores, como calambres y sensación de frío en las piernas.

2. Antes de tomar GINKGO BILOBA BESCANSÁ.

No tome GINKGO BILOBA BESCANSÁ:

Si es usted alérgico a algunos de los componentes de la especialidad.

CORREO ELECTRÓNICO

sugerencias_ft@aemps.es

Se atenderán exclusivamente incidencias informáticas sobre la aplicación CIMA (<https://cima.aemps.es>)

C/ CAMPEZO, 1 – EDIFICIO 8
28022 MADRID



Tenga especial cuidado con GINKGO BILOBA BESCANSA:

No se debe administrar más de 8 semanas seguidas, excepto por indicación del médico. Si los síntomas empeoran o persisten después de este período de tiempo, a pesar de la toma regular y dosis suficiente, se debe consultar con el médico, indicándole la dosis y el tiempo que ha tomado este medicamento.

Este medicamento contiene 47,5 % de etanol en volumen final. Cada ml de solución contiene 475 mg de etanol lo que puede ser causa de riesgo en niños, mujeres embarazadas y pacientes con enfermedad hepática, alcoholismo, epilepsia, daños o lesiones cerebrales. Puede modificar o potenciar el efecto de otros medicamentos.

Uso en niños:

No se dispone de suficiente experiencia clínica en este grupo de edad. Se han dado casos aislados de convulsiones tónico-clónicas y pérdida de consciencia, no se debe administrar a menores de 18 años.

Embarazo

No hay estudios adecuados y bien controlados en mujeres embarazadas, por lo que no se recomienda su uso sin prescripción médica.

IMPORTANTE PARA LA MUJER.

Si está embarazada o cree que pudiera estarlo, consulte a su médico antes de tomar este medicamento. El consumo de medicamentos durante el embarazo puede ser peligroso para el embrión o el feto y debe ser vigilado por su médico.

Lactancia

No existe información del paso de los componentes del extracto a la leche materna. Se recomienda que consulte a su médico o farmacéutico antes de tomar este medicamento durante la lactancia.

Conducción y uso de máquinas:

Durante el tratamiento puede producirse disminución de los reflejos y somnolencia, lo que debe ser tenido en cuenta para la conducción de vehículos o el manejo de otra maquinaria.

Toma de otros medicamentos:

El *Ginkgo biloba* puede aumentar la acción de los antiagregantes plaquetarios (por ejemplo medicamentos que mejoran la circulación sanguínea), por lo que, si usted está en tratamiento con algún medicamento de este tipo, consulte a su médico o farmacéutico.

Informe a su médico o farmacéutico si está tomando, o ha tomado recientemente cualquier otro medicamento, incluso los adquiridos sin receta médica.

3. Cómo tomar GINKGO BILOBA BESCANSA

Siga estas instrucciones a menos que su médico le haya dado otras indicaciones distintas.

Este medicamento se utiliza por vía oral.

- **Adultos:** 1 ml tres veces al día (120 mg de extracto de *Ginkgo biloba* al día), de 6-8 semanas.
- **Ancianos:** igual que los adultos.



En caso necesario, la dosis podrá ser de 2 ml, tres veces al día (240 mg de extracto de *Ginkgo biloba* al día).

Para su correcta administración, echar 1 ml de la solución oral sobre un vaso de agua u otro líquido.

Si estima que la acción de GINKGO BILOBA BESCANSÁ es demasiado fuerte o demasiado débil, comuníquesele a su médico o farmacéutico.

Si usted toma más GINKGO BILOBA BESCANSÁ del que debiera:

No se han descrito casos de sobredosificación con **GINKGO BILOBA BESCANSÁ**. Si usted ha tomado más **GINKGO BILOBA BESCANSÁ** del que debiera, consulte con su médico o farmacéutico.

En caso de sobredosis o ingestión accidental, consultar al Servicio de Información Toxicológica, Teléfono 91 562 04 20, indicando el producto y la cantidad ingerida.

Si olvidó tomar GINKGO BILOBA BESCANSÁ:

No tome una dosis doble para compensar las dosis olvidadas.

4. Posibles efectos adversos

A las dosis recomendadas de GINKGO BILOBA BESCANSÁ pueden aparecer trastornos gastrointestinales, dolores de cabeza, alergia o erupción en la piel, palpitaciones y vértigo.

Si se observa éstas o cualquier otra reacción adversa no descrita en este prospecto, consulte a su médico o farmacéutico.

5. Conservación de GINKGO BILOBA BESCANSÁ:

Conservar en el envase original.

Manténgase GINKGO BILOBA BESCANSÁ fuera del alcance y de la vista de los niños.

Caducidad:

No utilizar GINKGO BILOBA BESCANSÁ después de la fecha de caducidad indicada en el envase.

Este prospecto ha sido aprobado en Octubre de 2003.