



**Lea todo el prospecto detenidamente porque contiene información importante para usted.**

Este medicamento puede obtenerse sin receta, para el tratamiento de afecciones menores, sin la intervención de un médico. No obstante, debe usted utilizar con cuidado **CURADONA 10% solución cutánea en envase unidosis** para obtener los mejores resultados.

- Conserve este prospecto. Puede tener que volver a leerlo.
- Si necesita información adicional o consejo, consulte a su farmacéutico
- Si los síntomas empeoran o persisten, después de 5 días debe consultar a su médico

**En este prospecto se explica:**

1. Qué es **CURADONA 10% solución cutánea en envase unidosis** y para qué se utiliza
2. Antes de tomar **CURADONA 10% solución cutánea en envase unidosis**
3. Cómo tomar **CURADONA 10% solución cutánea en envase unidosis**
4. Posibles efectos adversos
5. Conservación de **CURADONA 10% solución cutánea en envase unidosis**

® **CURADONA 10%**  
**solución cutánea en envase unidosis**  
**Povidona iodada**

Cada 100 ml de solución contienen como principio activo:  
10 g de povidona iodada.

Los demás componentes (excipientes) son: glicerol, alquileter polioxietileno, hidrógenofosfato de disodio dodecahidrato, ácido cítrico monohidrato, hidróxido de sodio y agua purificada.

**Titular de la autorización de comercialización y responsable de la fabricación:**

LAINCO, S.A.  
Avda. Bizet, 8-12, 08191-Rubí (BARCELONA)

**QUÉ ES CURADONA Y PARA QUÉ SE UTILIZA**

Se presenta en forma de solución cutánea, en envases unidosis con 10 ml ó 5 ml.

Está indicada como desinfectante de la piel de uso general en: pequeñas heridas y cortes superficiales, quemaduras leves o rozaduras.

**ANTES DE USAR CURADONA**

**No use CURADONA:**

- Si es usted alérgico al yodo, a medicamentos iodados o a cualquiera de los componentes de este medicamento
- En recién nacidos (de 0 a 1 mes).

**Tenga especial cuidado con CURADONA:**

- No utilice este producto durante mucho tiempo o en zonas muy grandes de la piel sin consultar al médico, especialmente si sufre quemaduras que afecten a más del 20% de la superficie corporal, heridas grandes o abiertas, fallo renal o trastornos tiroideos.
- Si su médico le indica que es necesario utilizar este medicamento durante un periodo largo de tiempo o que debe utilizarse en quemaduras o zonas extensas de la piel deberá consultar con su médico la conveniencia de realizarle pruebas de la función tiroidea.
- No caliente el producto antes de aplicarlo.
- Este producto es de uso exclusivamente externo, sobre la piel. Evite el contacto con los ojos, oídos y otras mucosas.
- Evite el uso continuado del producto.

**Embarazo**

Consulte a su médico o farmacéutico antes de tomar un medicamento.

Las mujeres embarazadas deben evitar la aplicación de **CURADONA** sobre áreas extensas de piel y en la zona vaginal, así como su uso prolongado, sin antes consultar al médico.

**Lactancia**

Consulte a su médico o farmacéutico antes de tomar un medicamento.

No se recomienda su administración a mujeres durante el periodo de lactancia ya que el yodo absorbido puede pasar a la leche materna, por lo que podría llegar a producir hipotiroidismo en el lactante.

**Conducción y uso de máquinas**

No se han descrito efectos de **CURADONA** sobre la capacidad de conducir o utilizar maquinaria.

**Uso en niños**

No administrar este medicamento a niños menores de 30 meses sin antes consultar al médico.

**Uso de otros medicamentos**

Informe a su médico o farmacéutico si está tomando, o ha tomado recientemente, cualquier medicamento, incluso los adquiridos sin receta médica.

No utilice **CURADONA** al mismo tiempo que otros productos que contengan derivados del mercurio, ya que éstos reaccionan con el yodo formando compuestos que son irritantes.

Los pacientes en tratamiento con litio deben evitar el uso continuado de **CURADONA** sin antes consultar con el médico.

**Interacciones con pruebas diagnósticas:**

Este medicamento podría interferir en los resultados de pruebas de la función tiroidea y en las de detección de sangre oculta en heces y orina, por lo que debe avisar a su médico antes de que le hagan estas pruebas.

**CÓMO USAR CURADONA**

**USO CUTÁNEO**

Siga estas instrucciones, a menos que su médico le haya dado otras indicaciones distintas.

Después de lavar y secar, aplique una pequeña cantidad de producto directamente sobre la zona afectada de la piel, de 2 a 3 veces al día.

**CORREO ELECTRÓNICO**

[sugerencias\\_ft@aemps.es](mailto:sugerencias_ft@aemps.es)

Se atenderán exclusivamente incidencias informáticas sobre la aplicación CIMA (<https://cima.aemps.es>)

C/ CAMPEZO, 1 – EDIFICIO 8  
28022 MADRID



Este producto puede manchar la piel y la ropa. En caso de que esto ocurra, aplique agua para eliminar la mancha en la piel y para quitar las manchas de la ropa, lave la prenda con agua y jabón.

Si los síntomas empeoran o persisten después de 5 días, consulte con su médico.

Si estima que la acción de **CURADONA** es demasiado fuerte o débil, comuníquese a su médico o farmacéutico.

**Si usted usa más CURADONA de la que debiera**

Si usted ha utilizado más **CURADONA** de la que debiera, consulte a su médico o farmacéutico. En caso de sobredosis o de ingestión accidental, consultar al Servicio de Información de Toxicología, teléfono 91 562 04 20, indicando el producto y la cantidad ingerida.

En el caso de que se aplique una cantidad excesiva de producto y se produzca irritación en la piel, lavar la zona lesionada con abundante agua y, si la irritación continúa, acuda al médico.

**Si olvidó utilizar CURADONA:**

No administre una dosis doble para compensar la dosis olvidada.

**POSIBLES EFECTOS ADVERSOS**

Como todos los medicamentos, **CURADONA** puede tener efectos adversos.

Aunque la povidona yodada es menos irritante que el yodo, en raras ocasiones se pueden producir reacciones cutáneas locales, como irritación local, picor o escozor. En estos casos, se debe suspender el tratamiento y lavar la zona afectada con agua. Sin embargo, las reacciones adversas pueden llegar a ser más graves si el producto se utiliza durante mucho tiempo, o bien se aplica sobre heridas grandes o sobre quemaduras extensas.

Si observa cualquier otro efecto adverso no descrito anteriormente, consulte a su médico o farmacéutico.

**CONSERVACIÓN DE CURADONA**

No precisa condiciones especiales de conservación.

Mantener fuera del alcance y de la vista de los niños.

Los medicamentos no se deben tirar a las aguas residuales o a la basura. Pregunte a su farmacéutico cómo deshacerse de los medicamentos que no necesita. De ésta forma ayudará a proteger el medio ambiente.

**Caducidad**

No utilizar después de la fecha de caducidad indicada en el envase.



Este prospecto ha sido aprobado en Noviembre 2005