



LISTADO DE PRINCIPIOS ACTIVOS E INCORPORACIÓN DEL PICTOGRAMA DE LA CONDUCCIÓN

Grupo M – Sistema musculoesquelético. **Subgrupo M03** – Relajantes musculares.

Fecha de publicación 02.06.10. Versión 001

SUBGRUPO	P. ACTIVOS	PICTOGRAMA	PROPUESTA REDACTADO
M03A: AGENTES RELAJANTES MUSCULARES DE ACCIÓN PERIFÉRICA			
M03AB Derivados de la colina	Suxametonio	No	Dado que X se utiliza como coadyuvante de la anestesia general, deben tomarse las medidas de precaución usuales tras la anestesia general en pacientes ambulatorios.
M03AC Otros compuestos de amonio cuaternario	Atracurio,besilato	No	Dado que X se utiliza como coadyuvante de la anestesia general, deben tomarse las medidas de precaución usuales tras la anestesia general en pacientes ambulatorios.
	Cisatracurio,besilato		
	Mivacurio,cloruro		
	Pancuronio,bromuro		
	Rocuronio,bromuro		
M03AX Otros agentes relajantes musculares de acción periférica	Toxina Botulínica A	Sí	Ficha Técnica (sección 4.7) X puede producir astenia, debilidad muscular, <otras reacciones adversas>, por tanto los pacientes deben evitar realizar actividades potencialmente peligrosas, como conducir vehículos o utilizar máquinas hasta que estos efectos desaparezcan. Prospecto Este medicamento puede producir cansancio, debilidad muscular, <otras reacciones adversas>. Si nota alguno de estos efectos evite conducir vehículos o utilizar máquinas hasta que estos efectos desaparezcan.
	Toxina Botulínica B	No	

Nota: Ver normas generales de interpretación de los listados (<http://www.aemps.es/indFarma/etiqueProspectos/conduccion/normasListados.htm>)

CORREO ELECTRÓNICO

sdaem@aemps.es



LISTADO DE PRINCIPIOS ACTIVOS E INCORPORACIÓN DEL PICTOGRAMA DE LA CONDUCCIÓN.

Grupo M – Sistema musculoesquelético. **Subgrupo M03** – Relajantes musculares.

Fecha de publicación 02.06.10. Versión 001



SUBGRUPO	P. ACTIVOS	PICTOGRAMA	PROPUESTA REDACTADO
M03B: AGENTES RELAJANTES MUSCULARES DE ACCIÓN CENTRAL			
M03BA Ésteres del ácido carbámico	Carisoprodol	Sí	Ficha Técnica (sección 4.7): Es necesario informar al paciente de la posibilidad de aparición de somnolencia durante el tratamiento, lo que deberá ser tenido en cuenta en aquellos pacientes que desempeñen tareas que requieran vigilancia. Prospecto Durante el tratamiento con X puede aparecer somnolencia, lo que deberá ser tenido en cuenta en aquellos pacientes que desempeñen tareas que requieran vigilancia.
	Metocarbamol	Sí	
M03BX Otros agentes de acción central	Baclofeno	Sí	Ficha Técnica (sección 4.7) X puede producir somnolencia, <otras reacciones adversas> en algunos pacientes. Se aconseja precaución en la utilización de vehículos o maquinaria peligrosa y en el desempeño de otras actividades que requieran un estado especial de alerta. Prospecto X puede producir somnolencia, mareos, problemas de visión o torpeza o inestabilidad en algunas personas. Si esto le ocurre, no conduzca ni utilice herramientas ni maquinaria peligrosa.
	Ciclobenzaprina		

Nota: Ver normas generales de interpretación de los listados (<http://www.aemps.es/indFarma/etiqueProspectos/conduccion/normasListados.htm>)



LISTADO DE PRINCIPIOS ACTIVOS E INCORPORACIÓN DEL PICTOGRAMA DE LA CONDUCCIÓN.

Grupo M – Sistema musculoesquelético. **Subgrupo M03** – Relajantes musculares.

Fecha de publicación 02.06.10. Versión 001



SUBGRUPO	P. ACTIVOS	PICTOGRAMA	PROPUESTA REDACTADO
M03B: AGENTES RELAJANTES MUSCULARES DE ACCIÓN CENTRAL			
M03BX Otros agentes de acción central	Tetrazepam	Sí	Ficha Técnica (sección 4.7): Se debe advertir al paciente del riesgo de somnolencia asociada a la administración de este fármaco, especialmente a aquellos pacientes que conduzcan vehículos y utilicen maquinaria. Las combinaciones pueden potenciar el efecto sedante (Ver sección. 4.5 "Interacciones con otros medicamentos y otras formas de interacción"). La ingestión simultánea de alcohol y/o fármacos depresores del sistema nervioso central así como un sueño de duración insuficiente potencian la dificultad de concentración del individuo. Prospecto X se ha asociado a somnolencia y por tanto, puede disminuir el estado de alerta, especialmente si ha ingerido alcohol. Por ello, usted debe tener especial precaución cuando vaya a conducir o utilizar herramientas y/o maquinaria peligrosa. La combinación de X con otros medicamentos puede potenciar el efecto sedante. La ingestión junto con alcohol y/o otros medicamentos, que son depresores del sistema nervioso central, así como un sueño de duración insuficiente aumentan la dificultad de concentración.
	Tizanidina		Ficha Técnica (sección 4.7): X puede producir somnolencia, mareos u otros signos o síntomas de hipotensión, por lo que no se recomienda conducir vehículos o manejar maquinaria mientras se tome esta medicación. Prospecto X puede hacerle sentir somnoliento, mareos, sudor frío, ver destellos, por lo que no debe conducir ni utilizar maquinaria peligrosa mientras tome este medicamento.

Nota: Ver normas generales de interpretación de los listados (<http://www.aemps.es/indFarma/etiqueProspectos/conduccion/normasListados.htm>)