

LISTADO DE PRINCIPIOS ACTIVOS E INCORPORACIÓN DEL PICTOGRAMA DE LA CONDUCCIÓN.
Grupo N - Sistema nervioso. Subgrupo N06 - Psicoanalépticos. Fecha de publicación 05.03.15. Versión 004

Inclusión de nuevo principio activo a 5 de marzo de 2015: Vortioxetina.

SUBGRUPO	P. ACTIVOS	PICTOGRAMA	PROPUESTA REDACTADO
N06A: ANTIDEPRESIVOS			
N06AA a N06AX	Agomelatina	Sí	<p>Ficha Técnica (sección 4.7) X puede producir sedación, mareos. Por consiguiente, se debe indicar a los pacientes que si experimentan sedación o mareos, deben evitar la realización de tareas potencialmente peligrosas, como conducir o utilizar máquinas.</p> <p>Prospecto Durante el tratamiento con X puede que se sienta somnoliento o mareado. No conduzca ni maneje herramientas o máquinas hasta que sepa cómo le afecta el tratamiento con X.</p>
	Amitriptilina		
	Bupropion		
	Citalopram		
	Clomipramina		
	Dosulepina		
	Doxepina		
	Duloxetina		
	Escitalopram		
	Fluoxetina		
	Fluvoxamina		
	Imipramina		
	Maprotilina		
	Moclobemida		
	Mianserina		
	Mirtazapina		
	Nortriptilina		
	Oxitriptan		
	Paroxetina		
	Reboxetina		
Sertralina			
Tranilcipromina			
Trimipramina			
Trazadona			
Venlafaxina			
Vortioxetina			

Nota: Ver normas generales de interpretación de los listados (<http://www.aemps.gob.es/industria/etiquetado/conduccion/listadosPrincipios/normasListados.htm>)

CORREO ELECTRÓNICO

smhaem@aemps.es



LISTADO DE PRINCIPIOS ACTIVOS E INCORPORACIÓN DEL PICTOGRAMA DE LA CONDUCCIÓN.
Grupo N - Sistema nervioso. Subgrupo N06 - Psicoanalépticos. Fecha de publicación 05.03.15. Versión 004



SUBGRUPO	P. ACTIVOS	PICTOGRAMA	PROPUESTA REDACTADO
N06B: PSICOESTIMULANTES, AGENTES UTILIZADOS PARA LA ADHD Y NOOTRÓPICOS			
N06BA a N06BX	Atomoxetina	Sí	<p>Ficha Técnica (sección 4.7) La administración de atomoxetina se asoció con una mayor tasa de fatiga en comparación con placebo. Sólo en pacientes pediátricos, la administración de atomoxetina se asoció con una mayor tasa de somnolencia en comparación con placebo. Se debe aconsejar a los pacientes que tengan especial cuidado al conducir o utilizar maquinaria peligrosa hasta que estén razonablemente seguros de que su comportamiento no se ve afectado por la atomoxetina.</p> <p>Prospecto X puede producirle cansancio o somnolencia. Tenga cuidado si conduce o utiliza maquinaria pesada hasta que sepa como le afecta la toma de X. Si se siente cansado o con somnolencia no debería conducir o utilizar maquinaria pesada.</p>
	Metilfenidato	Sí	<p>Ficha Técnica (sección 4.7) Metilfenidato puede causar mareos, somnolencia y alteraciones visuales incluyendo dificultades de acomodación, diplopía y visión borrosa. Puede tener una influencia moderada en la capacidad para conducir y utilizar máquinas. Se debe advertir a los pacientes de estos posibles efectos y aconsejarles que si se ven afectados por ellos, eviten actividades potencialmente peligrosas como conducir o utilizar máquinas</p> <p>Prospecto Pueden producirse mareos, somnolencia y alteraciones visuales durante el tratamiento con metilfenidato. Si aparecen estos efectos secundarios, puede ser peligroso realizar actividades comprometidas (como conducir, manejar máquinas, montar en bicicleta o trepar a los árboles) hasta estar seguro de que usted o su hijo no están afectados.</p>

Nota: Ver normas generales de interpretación de los listados (<http://www.aemps.gob.es/industria/etiquetado/conduccion/listadosPrincipios/normasListados.htm>)



LISTADO DE PRINCIPIOS ACTIVOS E INCORPORACIÓN DEL PICTOGRAMA DE LA CONDUCCIÓN.
Grupo N - Sistema nervioso. Subgrupo N06 - Psicoanalépticos. Fecha de publicación 05.03.15. Versión 004



SUBGRUPO	P. ACTIVOS	PICTOGRAMA	PROPUESTA REDACTADO
N06B: PSICOESTIMULANTES, AGENTES UTILIZADOS PARA LA ADHD Y NOOTRÓPICOS			
N06BA a N06BX	Modafinilo	Sí	Ficha técnica: Las reacciones adversas como visión borrosa o mareos pueden afectar la capacidad para conducir (ver sección 4.8). Prospecto: Modafinilo puede producir visión borrosa o mareos. Si nota alguno de estos efectos evite conducir vehículos o utilizar máquinas.
	Cafeina	No	
	Citicolina		
	Piracetam	Sí	
	Vinpocetina		
	Hypericum perforatum (Hipérico)	No	
Lisdexanfetamina	Sí		

Nota: Ver normas generales de interpretación de los listados (<http://www.aemps.gob.es/industria/etiquetado/conduccion/listadosPrincipios/normasListados.htm>)



LISTADO DE PRINCIPIOS ACTIVOS E INCORPORACIÓN DEL PICTOGRAMA DE LA CONDUCCIÓN.
Grupo N - Sistema nervioso. Subgrupo N06 - Psicoanalépticos. Fecha de publicación 05.03.15. Versión 004



SUBGRUPO	P. ACTIVOS	PICTOGRAMA	PROPUESTA REDACTADO
N06D: FÁRMACOS ANTI-DEMENCIA			
N06DA a N06DX	Donepezilo	Sí	Ficha Técnica (sección 4.7) La enfermedad de Alzheimer puede provocar un deterioro gradual de la capacidad de conducción o comprometer la capacidad de utilizar máquinas. Además, X puede provocar mareos y somnolencia, principalmente cuando se inicia el tratamiento o al aumentar la dosis. La influencia de X sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas es leve o moderada. Por tanto, el médico evaluará regularmente la capacidad de los pacientes con demencia para seguir conduciendo o manejando maquinaria compleja. Prospecto Su enfermedad puede afectar la capacidad de conducir o utilizar maquinaria y no debe llevar a cabo estas actividades a menos que su médico le indique que es seguro realizarlas. X puede causar mareos y somnolencia, principalmente al inicio del tratamiento o al aumentar la dosis. Si experimenta estos efectos, no debe conducir o utilizar maquinaria.
	Galantamina		
	Memantina		
	Rivastigmina		
	Ginkgo (ginkgo biloba)	No	

Nota: Ver normas generales de interpretación de los listados (<http://www.aemps.gob.es/industria/etiquetado/conduccion/listadosPrincipios/normasListados.htm>)