

LISTADO DE PRINCIPIOS ACTIVOS E INCORPORACIÓN DEL PICTOGRAMA DE LA CONDUCCIÓN.

Grupo S - Órganos de los sentidos. Subgrupo S01 - Oftalmológicos. Fecha de publicación 01.02.16. Versión 005

Inclusión de nuevo principio activo a 1 de febrero de 2016: Ciclosporina, células epiteliales corneales.

SUBGRUPO	P. ACTIVOS	PICTOGRAMA	PROPUESTA REDACTADO
S01A: ANTIINFECCIOSOS			
S01AA Antibióticos	Azitromicina (oftálmica)	No	<p>Ficha Técnica (Sección 4.7): Después de la instilación, puede aparecer visión borrosa transitoria <y otras alteraciones visuales>, que puede afectar a la capacidad para conducir o utilizar máquinas. Si aparecen estos efectos, el paciente debe esperar hasta que la visión sea nítida antes de conducir o utilizar máquinas.</p> <p>Prospecto: Puede notar visión borrosa inmediatamente después de la aplicación de X. No conduzca ni utilice máquinas hasta que haya desaparecido este efecto.</p>
	Cloranfenicol (oftálmico)		
	Clortetraciclina (oftal)		
	Eritromicina (oftal)		
	Fusídico, ácido (oftal)		
	Gentamicina (oftal)		
S01AD Antivirales	Aciclovir (oftal)		
	Ganciclovir (oftal)		
	Trifluridina (oftal)		
S01AX Otros Antiinfecciosos	Ciprofloxacino (oftálmico)		
	Lomefloxacino (oftal)		
	Norfloxacino (oftal)		
	Ofloxacino (oftal)		
	Moxifloxacino		
	Alcohol polivinílico		

Nota: Ver normas generales de interpretación de los listados (<http://www.aemps.gob.es/industria/etiquetado/conduccion/listadosPrincipios/normasListados.htm>)

CORREO ELECTRÓNICO

sdaem@aemps.es



LISTADO DE PRINCIPIOS ACTIVOS E INCORPORACIÓN DEL PICTOGRAMA DE LA CONDUCCIÓN.
Grupo S - Órganos de los sentidos. Subgrupo S01 - Oftalmológicos. Fecha de publicación 01.02.16. Versión 005



SUBGRUPO	P. ACTIVOS	PICTOGRAMA	PROPUESTA REDACTADO
S01B: AGENTES ANTIINFLAMATORIOS			
S01BA Corticosteroides, monofármacos	Dexametasona (oftálmica)	No	
	Hidrocortisona (oftal)		
	Prednisolona (oftal)		
S01BB Corticosteroides y midriáticos en combinación		Sí	
S01BC Agentes antiinflamatorios no esteroidicos	Diclofenaco (oftalmolog.)	No	Ficha Técnica (Sección 4.7): Después de la instilación, puede aparecer visión borrosa transitoria <y otras alteraciones visuales>, que puede afectar a la capacidad para conducir o utilizar máquinas. Si aparecen estos efectos, el paciente debe esperar hasta que la visión sea nítida antes de conducir o utilizar máquinas. Prospecto: Puede notar visión borrosa inmediatamente después de la aplicación de X. No conduzca ni utilice máquinas hasta que haya desaparecido este efecto.
	Indometacina (oftal)		
	Ketorolaco (oftalmolog)		
	Pranoprofeno (oftal)		
	Bromfenaco		
	Nepafenaco		

Nota: Ver normas generales de interpretación de los listados (<http://www.aemps.gob.es/industria/etiquetado/conduccion/listadosPrincipios/normasListados.htm>)



LISTADO DE PRINCIPIOS ACTIVOS E INCORPORACIÓN DEL PICTOGRAMA DE LA CONDUCCIÓN.
Grupo S - Órganos de los sentidos. Subgrupo S01 - Oftalmológicos. Fecha de publicación 01.02.16. Versión 005

SUBGRUPO	P. ACTIVOS	PICTOGRAMA	PROPUESTA REDACTADO
S01C: AGENTES ANTIINFLAMATORIOS Y ANTIINFECCIOSOS EN COMBINACIÓN			
S01CA Corticosteroides y antiinfecciosos en combinación		No	
S01CB Corticosteroides, antiinfecciosos y midriáticos en combinación		Sí	
S01CC Agentes antiinflamatorios no esteroideos y antiinfecciosos en combinación		No	

Nota: Ver normas generales de interpretación de los listados (<http://www.aemps.gob.es/industria/etiquetado/conduccion/listadosPrincipios/normasListados.htm>)



LISTADO DE PRINCIPIOS ACTIVOS E INCORPORACIÓN DEL PICTOGRAMA DE LA CONDUCCIÓN.
Grupo S - Órganos de los sentidos. Subgrupo S01 - Oftalmológicos. Fecha de publicación 01.02.16. Versión 005

SUBGRUPO	P. ACTIVOS	PICTOGRAMA	PROPUESTA REDACTADO
S01E: PREPARADOS CONTRA EL GLAUCOMA Y MIÓTICOS			
S01EA Simpaticomiméticos en la terapia del glaucoma	Apraclonidina	Sí	Ficha Técnica (sección 4.7): X puede producir visión borrosa y/o alterada, fatiga y/o somnolencia, que puede afectar a la capacidad para conducir o utilizar máquinas, <especialmente por la noche o cuando exista poca luz>. El paciente debe esperar hasta que estos síntomas desaparezcan antes de conducir o de utilizar máquinas. Prospecto: Este medicamento puede causar somnolencia, cansancio o visión borrosa en algunos pacientes. Si nota alguno de estos efectos, no conduzca ni utilice máquinas hasta que estos efectos hayan desaparecido.
	Brimonidina		
	Clonidina (oftal)		
	Dipivefrina		

Nota: Ver normas generales de interpretación de los listados (<http://www.aemps.gob.es/industria/etiquetado/conduccion/listadosPrincipios/normasListados.htm>)



LISTADO DE PRINCIPIOS ACTIVOS E INCORPORACIÓN DEL PICTOGRAMA DE LA CONDUCCIÓN.
Grupo S - Órganos de los sentidos. Subgrupo S01 - Oftalmológicos. Fecha de publicación 01.02.16. Versión 005

SUBGRUPO	P. ACTIVOS	PICTOGRAMA	PROPUESTA REDACTADO
S01E: PREPARADOS CONTRA EL GLAUCOMA Y MIÓTICOS			
S01EB Para-simpaticomiméticos	Aceclidina	Sí	Ficha Técnica (Sección 4.7): Después de la instilación, puede aparecer visión borrosa <y otras alteraciones visuales> <durante un tiempo prolongado> <durante al menos x horas, días> que puede afectar a la capacidad para conducir o utilizar máquinas. Si aparecen estos efectos, el paciente debe esperar hasta que la visión sea nítida antes de conducir o utilizar máquinas. Prospecto: Puede notar visión borrosa <y otras alteraciones visuales> <durante un tiempo prolongado> <durante al menos x horas, días>. No conduzca ni utilice máquinas hasta que haya desaparecido este efecto.
	Acetilcolina,cloruro		
	Pilocarpina (oftal)		
S01EC Inhibidores de la anhidrasa carbónica	Acetazolamida	No	
	Brinzolamida		
	Diclofenamida		
	Dorzolamida		
S01ED Agentes betabloqueantes	Betaxolol (oftal)		
	Carteolol (oftal)		
	Levobunolol		
	Metipranolol		
	Timolol (oftálmico)		

Nota: Ver normas generales de interpretación de los listados (<http://www.aemps.gob.es/industria/etiquetado/conduccion/listadosPrincipios/normasListados.htm>)



LISTADO DE PRINCIPIOS ACTIVOS E INCORPORACIÓN DEL PICTOGRAMA DE LA CONDUCCIÓN.
Grupo S - Órganos de los sentidos. Subgrupo S01 - Oftalmológicos. Fecha de publicación 01.02.16. Versión 005

SUBGRUPO	P. ACTIVOS	PICTOGRAMA	PROPUESTA REDACTADO
S01E: PREPARADOS CONTRA EL GLAUCOMA Y MIÓTICOS			
S01EE Análogos de prostaglandinas	Bimatoprost	No	
	Latanoprost		
	Tafluprost		
	Travoprost		
S01EX Otros preparados contra el glaucoma	Glicerol (oral)		
S01F: MIDRIÁTICOS Y CICLOPLÉJICOS			
S01FA Anticolinérgicos	Atropina (oftal)	Sí	Ficha Técnica (Sección 4.7): Después de la instilación, puede aparecer visión borrosa <y otras alteraciones visuales> <durante un tiempo prolongado> <durante al menos x horas, días> que puede afectar a la capacidad para conducir o utilizar máquinas. Si aparecen estos efectos, el paciente debe esperar hasta que la visión sea nítida antes de conducir o utilizar máquinas.
	Ciclopentolato		
	Escopolamina (oftal)		
	Homatropina		
	Tropicamida		
S01FB Simpaticomiméticos, excluyendo preparados contra el glaucoma	Fenilefrina (oftal)		Prospecto: Puede notar visión borrosa <y otras alteraciones visuales> <durante un tiempo prolongado> <durante al menos x horas, días>. No conduzca ni utilice máquinas hasta que haya desaparecido este efecto.

Nota: Ver normas generales de interpretación de los listados (<http://www.aemps.gob.es/industria/etiquetado/conduccion/listadosPrincipios/normasListados.htm>)



LISTADO DE PRINCIPIOS ACTIVOS E INCORPORACIÓN DEL PICTOGRAMA DE LA CONDUCCIÓN.
Grupo S - Órganos de los sentidos. Subgrupo S01 - Oftalmológicos. Fecha de publicación 01.02.16. Versión 005



SUBGRUPO	P. ACTIVOS	PICTOGRAMA	PROPUESTA REDACTADO
S01G: DESCONGESTIVOS Y ANTIALÉRGICOS			
S01GA Simpaticomiméticos usados como descongestivos	Nafazolina (oftal)	No	
	Oximetazolina (oftal)		
	Fenilefrina (oftal)		
S01GX Otros antialérgicos	Cromoglicico, ácido (oftal)	No	Ficha Técnica (Sección 4.7): Después de la instilación, puede aparecer visión borrosa transitoria, <somnolencia> que puede afectar a la capacidad para conducir o utilizar máquinas. Si aparecen estos efectos, el paciente debe esperar hasta que la visión sea nítida antes de conducir o utilizar máquinas. Prospecto: Puede notar visión borrosa inmediatamente después de la aplicación de X. No conduzca ni utilice máquinas hasta que haya desaparecido este efecto.
	Emedastina		
	Epinastina		
	Espaglúmico, ácido		
	Ketotifeno (oftal)		
	Levocabastina (oftal)		
	Lodoxamida (oftal)		
	Nedocromilo (oftal)		
Olopatadina			
S01H: ANESTÉSICOS LOCALES			
S01HA Anestésicos locales	Oxibuprocaina	No	
S01J: AGENTES DE DIAGNÓSTICO			
S01JA Agentes colorantes	Fluoresceína	No	



LISTADO DE PRINCIPIOS ACTIVOS E INCORPORACIÓN DEL PICTOGRAMA DE LA CONDUCCIÓN.
Grupo S - Órganos de los sentidos. Subgrupo S01 - Oftalmológicos. Fecha de publicación 01.02.16. Versión 005



SUBGRUPO	P. ACTIVOS	PICTOGRAMA	PROPUESTA REDACTADO
S01K: AUXILIARES EN CIRUGÍA			
S01KA Sustancias viscosoelásticas	Carmelosa	No	
	Hipromelosa		
S01L: AGENTES CONTRA TRASTORNOS VASCULARES OCULARES			
S01LA Agentes antineovascularización	Pegaptanib	Sí	Ficha Técnica (Sección 4.7): Después de la administración, puede aparecer visión borrosa <y otras alteraciones visuales> <durante un tiempo prolongado> <durante al menos x horas, días> que puede afectar a la capacidad para conducir o utilizar máquinas. Si aparecen estos efectos, el paciente debe esperar hasta que la visión sea nítida antes de conducir o utilizar máquinas. Prospecto: Puede notar visión borrosa <y otras alteraciones visuales> <durante un tiempo prolongado> <durante al menos x horas, días>. No conduzca ni utilice máquinas hasta que haya desaparecido este efecto.
	Ranibizumab		
	Verteporfina		
	Aflibercept		

Nota: Ver normas generales de interpretación de los listados (<http://www.aemps.gob.es/industria/etiquetado/conduccion/listadosPrincipios/normasListados.htm>)



LISTADO DE PRINCIPIOS ACTIVOS E INCORPORACIÓN DEL PICTOGRAMA DE LA CONDUCCIÓN.
Grupo S - Órganos de los sentidos. Subgrupo S01 - Oftalmológicos. Fecha de publicación 01.02.16. Versión 005



SUBGRUPO	P. ACTIVOS	PICTOGRAMA	PROPUESTA REDACTADO
S01X: OTROS OFTALMOLÓGICOS			
S01XA Otros oftalmológicos	Alcohol polivinílico	No	
	Cromocarbodietilamina (oftal)		
	Edético, ácido		
	Hamamelis (hamamelis virginiana) (oftal)		
	Sodio, cloruro (oftal)		
	Vaselina (oftal)		
	Ocriplasma	Sí	
	Ciclosporina		
	Células epiteliales corneales		

Nota: Ver normas generales de interpretación de los listados (<http://www.aemps.gob.es/industria/etiquetado/conduccion/listadosPrincipios/normasListados.htm>)