

ACCESO PRECOZ AL TRATAMIENTO CON BOCEPREVIR / TELAPREVIR PACIENTES CON HEPATITIS CRÓNICA C

AÑO DE NACIMIENTO: _____

SEXO: Varón Mujer

DATOS RELATIVOS HEPATITIS C:

Genotipo: Genotipo 1a Genotipo 1b otros (especificar: _____)

Biopsia: F3 F4 NO DISPONIBLE

Fibroscan: _____ kPa IQR: _____

Child-Pugh: A B C

Tratamientos previos:

NO

Interferón + Ribavirina

Monoterapia con Interferón

Interferón Pegilado + Ribavirina

Categorización de respuesta a tratamientos previos:

RECAÍDA (carga viral indetectable al final del tratamiento (semana 48) pero detectable 24 semanas después).

NO RESPONDEDOR PARCIAL (al menos una reducción de 2 log₁₀ UI/ml respecto al valor basal de ARN del VHC en la semana 12, pero nunca carga viral indetectable).

NULL RESPONDER (descenso de menos de 2 log₁₀ en los niveles de RNA-VHC durante las 12 semanas iniciales del tratamiento con interferón pegilado y ribavirina).

Sin datos.

Descompensaciones previas.: NO SI

PARÁMETROS ANALÍTICOS: Fecha: _____

HCV-RNA (PCR cuantitativa)		Neutrófilos	
Hemoglobina		Plaquetas	

TRATAMIENTO PREVISTO:

Peg-INF alfa-2b + RBV + Telaprevir

Peg-INF alfa-2a + RBV + Telaprevir

Peg-INF alfa-2b + RBV + Boceprevir

Peg-INF alfa-2a + RBV + Boceprevir

Hospital: _____

Servicio: _____

Tel / Fax / Email: _____