

Lea todo el prospecto detenidamente antes de empezar a tomar el medicamento.

- Conserve este prospecto. Puede tener que volver a leerlo.
- Si tiene alguna duda, consulte a su médico o farmacéutico.
- Este medicamento se le ha recetado a Vd. personalmente y no debe darlo a otras personas. Puede perjudicarles, aún cuando sus síntomas sean los mismos que los suyos.

En este prospecto:

1. **Qué es ZYNTABAC 150mg Comprimidos de liberación prolongada y para qué se utiliza**
2. **Antes de tomar ZYNTABAC 150mg Comprimidos de liberación prolongada y para qué se utiliza**
3. **Cómo tomar ZYNTABAC 150mg Comprimidos de liberación prolongada**
4. **Posibles efectos adversos**
5. **Conservación de ZYNTABAC 150mg Comprimidos de liberación prolongada**

ZYNTABAC 150mg Comprimidos de liberación prolongada
Hidrocloruro de bupropión

Cada comprimido contiene:

Hidrocloruro de bupropión ... 150 mg

Los demás componentes son celulosa microcristalina, hipromelosa, hidrocloruro de cisteína monohidrato, estearato de magnesio, macrogol 400, dióxido de titanio E171, cera carnauba y óxido de hierro negro E172.

Titular:

Glaxo Wellcome, S.A.
PTM - c/ Severo Ochoa, 2
28760 - Tres Cantos (Madrid).

Fabricado por:

Glaxo Wellcome, S.A.
Avda . de Extremadura, 3
09400 – Aranda de Duero (Burgos).

1. QUÉ ES ZYNTABAC 150mg Comprimidos de liberación prolongada Y PARA QUÉ SE UTILIZA

ZYNTABAC 150mg Comprimidos de liberación prolongada se presenta en forma de comprimidos de liberación prolongada. Cada envase contiene 60 comprimidos.

ZYNTABAC reduce el deseo de fumar, por lo que ayuda a abandonar el hábito tabáquico. No se conoce completamente el mecanismo de acción de ZYNTABAC ; no obstante, se considera que interacciona con sustancias químicas en el cerebro que están relacionadas con el deseo de fumar.

ZYNTABAC se utiliza como ayuda para dejar de fumar, reduciendo el deseo de fumar.

2. ANTES DE TOMAR ZYNTABAC 150mg Comprimidos de liberación prolongada

No tome ZYNTABAC 150mg Comprimidos de liberación prolongada:

En caso de hipersensibilidad a bupropión o a cualquiera de los componentes de ZYNTABAC 150mg Comprimidos de liberación prolongada.

Si actualmente sufre de convulsiones o si tiene antecedentes de convulsiones (epilepsia) o de cambios de humor.

En caso de alteraciones del hábito alimenticio (bulimia o anorexia nerviosa) o de alteración grave de la función del hígado.

En caso de estar tomando conjuntamente medicamentos denominados inhibidores de la monoaminoxidasa.

Si está en un proceso para dejar de beber alcohol o si está dejando de tomar fármacos tipo benzodiazepinas para el insomnio y/o para la ansiedad.

Tenga especial cuidado con ZYNTABAC 150mg Comprimidos de liberación prolongada:

Cuando tome este medicamento, no deberá excederse la dosis recomendada por el médico; esto es importante para evitar el riesgo de que aparezcan convulsiones. Si en el pasado ha tenido un traumatismo en la cabeza o un tumor en el cerebro o convulsiones, consulte a su médico antes de tomar este medicamento.

- Si se abusa del alcohol
 - si se interrumpe repentinamente la toma de alcohol o de medicamentos denominados benzodiazepinas,
 - si padece diabetes que está siendo tratada con medicamentos denominados hipoglucemiantes o con insulina o bien
 - si toma estimulantes o productos para reducir el apetito,
- puede aumentar el riesgo de aparición de convulsiones.

Si tiene convulsiones durante el tratamiento con los comprimidos, interrumpa la toma y no vuelva a tomar ZYNTABAC .

Embarazo

Consulte a su médico o farmacéutico antes de tomar un medicamento. No se recomienda la administración de ZYNTABAC a mujeres embarazadas.

Lactancia

Consulte a su médico o farmacéutico antes de tomar un medicamento. No se recomienda la administración de ZYNTABAC a mujeres en periodo de lactancia.

Conducción y uso de máquinas:

No conduzca ni use maquinaria hasta saber si ZYNTABAC no está afectando su capacidad para realizar esas actividades.

Toma o uso de otros medicamentos:

Informe a su médico si está tomando otros medicamentos; en particular, si está en tratamiento con medicamentos para trastornos del corazón o de la tensión sanguínea, medicamentos para el tratamiento de la depresión u otras enfermedades mentales, medicamentos antiepilépticos, antibióticos (quinolonas) o medicamentos que contengan teofilina, pentazocina, orfenadrina, tramadol, ciclofosfamida o ifosfamida, medicamentos para la alergia que producen sueño o medicamentos para tratar el paludismo.

El uso de ZYNTABAC junto con parches de nicotina puede aumentar la tensión sanguínea. Su médico vigilará su tensión sanguínea de forma regular, a fin de asegurar que permanece dentro de niveles aceptables.

Informe a su médico o farmacéutico si está tomando, o ha tomado recientemente cualquier otro medicamento incluso los adquiridos sin receta médica.

3. CÓMO TOMAR ZYNTABAC 150mg Comprimidos de liberación prolongada:

Siga estas instrucciones a menos que su médico le haya dado otras indicaciones distintas.

Recuerde tomar su medicamento.

Su médico le indicará la duración de su tratamiento con ZYNTABAC . No suspenda el tratamiento antes.

Ingiera los comprimidos enteros; no triturarlos, dividirlos o masticarlos.

Tome los comprimidos según lo establecido por su médico. La dosis habitual recomendada en adultos mayores de 18 años es un comprimido (150mg) al día durante los seis primeros días.

Al séptimo día, comenzar tomando un comprimido (150mg) dos veces al día. Las dosis deberán tomarse dejando transcurrir un periodo de al menos 8 horas. No deberá sobrepasar nunca la dosis recomendada por toma ni la dosis total diaria recomendada.

Deberá transcurrir aproximadamente 1 semana para que los niveles adecuados de ZYNTABAC en su organismo resulten eficaces.

No se debe dejar de fumar mientras está tomando ZYNTABAC durante la primera semana, de esta forma aumentará la posibilidad de dejar de fumar. Usted deberá fijar una fecha para dejar de fumar durante la segunda semana que esté tomando ZYNTABAC .

No es arriesgado fumar y tomar ZYNTABAC al mismo tiempo. Sin embargo, seguir fumando después de la fecha que Usted ha fijado para dejar de fumar disminuirá de forma importante la oportunidad que tiene para romper su hábito tabáquico.

La mayoría de las personas deben tomar ZYNTABAC como mínimo durante 7 semanas.

Ancianos:- La dosis recomendada es de un comprimido (150mg) una vez al día.

Consulte a su médico o farmacéutico, en caso de no estar seguro de cuántos comprimidos tomar o la frecuencia con la que tomarlos.

Los comprimidos de ZYNTABAC pueden tener un olor característico, lo que se considera normal.

El uso de ZYNTABAC junto con parches de nicotina se realizará sólo bajo la supervisión de su médico.

Si estima que la acción de ZYNTABAC es demasiado fuerte o débil, comuníquese a su médico o farmacéutico.

Si Vd. toma más ZYNTABAC 150mg Comprimidos de liberación prolongada del que debiera:

Si Usted ha tomado ZYNTABAC más de lo que debe, consulte inmediatamente a su médico o farmacéutico o al Servicio de Información Toxicológica, teléfono: 91 5620420.

Si olvidó tomar ZYNTABAC 150mg Comprimidos de liberación prolongada:

No tome una dosis doble para compensar las dosis olvidadas. Esperar y tomar el siguiente comprimido en el momento que corresponda.

Efectos que se dan cuando se interrumpe el tratamiento con ZYNTABAC 150mg Comprimidos de liberación prolongada:

El médico le indicará si debe realizar una suspensión gradual de ZYNTABAC .

4. POSIBLES EFECTOS ADVERSOS

Como todos los medicamentos, ZYNTABAC 150mg Comprimidos de liberación prolongada puede tener efectos adversos.

Es importante advertir que dejar de fumar está frecuentemente relacionado con síntomas de retirada de la nicotina (por ejemplo, agitación, insomnio, temblor, sudoración), algunos de los cuales son también acontecimientos adversos relacionados con ZYNTABAC .

Existe la posibilidad de que aproximadamente 1 de cada 1000 personas que toman hidrocóloruro de bupropión, el principio activo de ZYNTABAC , padezca una crisis convulsiva. La posibilidad de que esto ocurra aumenta si Usted:

- Tiene o ha tenido convulsiones (por ejemplo, epilepsia)
- tiene o ha tenido una alteración en su hábito alimenticio (bulimia o anorexia nerviosa)
- toma más cantidad de ZYNTABAC que la recomendada o
- deja de tomar repentinamente medicamentos que sean sedantes/tranquilizantes tras su uso prolongado.

Si proporciona a su médico la información que él necesita y sigue atentamente las instrucciones de su médico acerca de cómo tomar ZYNTABAC , podrá reducir la posibilidad de experimentar una crisis.

Algunas personas pueden ser alérgicas a los medicamentos. Si tiene signos de una reacción alérgica tales como una erupción en la piel (habones), picores y enrojecimiento, dificultades para respirar, deje de tomar inmediatamente los comprimidos y póngase en contacto con su médico.

Los efectos adversos que podrían aparecer con más frecuencia son: sequedad de boca, dolor de cabeza, dificultad para dormir, trastornos digestivos (por ejemplo, náuseas y estreñimiento).

También pueden aparecer otros efectos adversos tales como: fiebre, cansancio, dolor en el pecho, aceleración de los latidos cardíacos, descenso o aumento de la tensión arterial, rubor, temblores, mareo, confusión, depresión, agitación, pérdida de la concentración, ansiedad, pérdida de apetito, zumbido de oídos, deterioro de la visión, alteración del sentido del gusto. Además se han comunicado: picor, sudoración y erupción en la piel, de forma aislada o junto con dolor en las articulaciones y dolores musculares, estado de excitabilidad o sensibilidad anormales y hostilidad.

Si se observa cualquier otra reacción adversa no descrita en este prospecto, consulte a su médico o farmacéutico.

5. CONSERVACIÓN DE ZYNTABAC 150mg Comprimidos de liberación prolongada:

Mantenga ZYNTABAC 150mg Comprimidos de liberación prolongada fuera del alcance y de la vista de los niños.

No conservar a temperatura superior a 25°C. Conservar en el envase original. Conservar protegido de la luz.

Caducidad:

Este medicamento no se debe utilizar después de la fecha de caducidad indicada en el envase.

Este prospecto ha sido aprobado en Mayo 2001.