



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE SANIDAD, POLÍTICA SOCIAL
E IGUALDAD

agencia española de
medicamentos y
productos sanitarios

LISTADO DE PRINCIPIOS ACTIVOS E INCORPORACIÓN DEL PICTOGRAMA DE LA CONDUCCIÓN.

Grupo A – Tracto alimentario y metabolismo. **Subgrupo A02** – Fármacos para alteraciones relacionadas con la acidez.

Fecha de publicación 03.05.11. Versión 001

SUBGRUPO	P. ACTIVOS	PICTOGRAMA	PROPUESTA REDACTADO
A02A ANTIÁCIDOS			
A02AA Antiácidos derivados de magnesio	Magnesio,Hidróxido	No	
A02AB Antiácidos derivados de aluminio	Algeldrato		
A02AD Combinaciones y complejos de aluminio, calcio y magnesio	Almagato		
	Almasilato		
	Hidrotalcita		
	Magaldrato		
	Algeldrato con Magnesio hidróxido y Magnesio carbonato		
	Algeldrato con Magnesio,óxido		
	Algeldrato con Magnesio carbonato, Magnesio trisilicato y Calcio carbonato		
	Algeldrato con Magnesio hidróxido		
	Calcio carbonato y Magnesio carbonato		
Algeldrato con Calcio carbonato, Aluminio, Magnesio			

Nota: Ver normas generales de interpretación de los listados (<http://www.aemps.es/indFarma/etiqueProspectos/conduccion/normasListados.htm>)

CORREO ELECTRÓNICO

sdaem@aemps.es



LISTADO DE PRINCIPIOS ACTIVOS E INCORPORACIÓN DEL PICTOGRAMA DE LA CONDUCCIÓN.

Grupo A – Tracto alimentario y metabolismo. **Subgrupo A02** – Fármacos para alteraciones relacionadas con la acidez.
Fecha de publicación 03.05.11. Versión 001



SUBGRUPO	P. ACTIVOS	PICTOGRAMA	PROPUESTA REDACTADO
A02A ANTIÁCIDOS			
A02AF Antiácidos con antiflatulentos	Algeldrato con Simeticona y Magnesio Hidróxido	No	
A02AH Antiácidos con bicarbonato sódico	Bicarbonato sódico		
	Bicarbonato sódico con Algeldrato, Ácido tartárico, Magnesio carbonato		
	Bicarbonato sódico con Algeldrato, Magnesio carbonato		
	Bicarbonato sódico y Ácido cítrico		
	Bicarbonato sódico y Ácido cítrico y tartárico		
A02AX Otras combinaciones de antiácidos	Simeticona con Aminoacetato de dihidroxialuminio, Magnesio trisilicato	Sí	
	Famotidina con Hidróxido de magnesio y Carbonato cálcico		
	Hinojo, Belladona, Carbonato cálcico, Citrato sódico, Bicarbonato sódico, Óxido magnesio, Carbonato magnesio, Ácido cítrico, Subnitrito bismuto, Salicilato bismuto		

Nota: Ver normas generales de interpretación de los listados (<http://www.aemps.es/indFarma/etiqueProspectos/conduccion/normasListados.htm>)

LISTADO DE PRINCIPIOS ACTIVOS E INCORPORACIÓN DEL PICTOGRAMA DE LA CONDUCCIÓN.



Grupo A – Tracto alimentario y metabolismo. **Subgrupo A02** – Fármacos para alteraciones relacionadas con la acidez.
Fecha de publicación 03.05.11. Versión 001



SUBGRUPO	P. ACTIVOS	PICTOGRAMA	PROPUESTA REDACTADO
A02B FÁRMACOS PARA LA ÚLCERA PÉPTICA Y REFLUJO GASTROESOFÁGICO			
A02BA Antiulcerosos: antagonistas del receptor H2	Cimetidina	No	
	Famotidina		<p>Ficha técnica (sección 4.7): Aunque no son de esperar efectos en este sentido, si se producen mareos, no se debe conducir ni utilizar maquinaria peligrosa.</p> <p>Prospecto: Aunque no son de esperar efectos en este sentido, si se producen mareos, no se debe conducir ni utilizar maquinaria peligrosa.</p>
	Ranitidina		<p>Ficha técnica (sección 4.7): Aunque no son de esperar efectos en este sentido, si se producen mareos, no se debe conducir ni utilizar maquinaria peligrosa.</p> <p>Prospecto: Aunque no son de esperar efectos en este sentido, si se producen mareos, no se debe conducir ni utilizar maquinaria peligrosa.</p>
A02BB Antiulcerosos: prostaglandinas	Misoprostol		

Nota: Ver normas generales de interpretación de los listados (<http://www.aemps.es/indFarma/etiqueProspectos/conduccion/normasListados.htm>)

LISTADO DE PRINCIPIOS ACTIVOS E INCORPORACIÓN DEL PICTOGRAMA DE LA CONDUCCIÓN.



Grupo A – Tracto alimentario y metabolismo. **Subgrupo A02** – Fármacos para alteraciones relacionadas con la acidez.
Fecha de publicación 03.05.11. Versión 001



SUBGRUPO	P. ACTIVOS	PICTOGRAMA	PROPUESTA REDACTADO
A02B FÁRMACOS PARA LA ÚLCERA PÉPTICA Y REFLUJO GASTROESOFÁGICO			
A02BC Antiulcerosos: inhibidores de la bomba de protones	Esomeprazol	No	<p>Ficha técnica (sección 4.7): No es probable que X afecte a la capacidad para conducir o utilizar máquinas. Pueden aparecer reacciones adversas a medicamentos tales como mareo y alteraciones visuales (ver sección 4.8). Si ocurrieran, los pacientes no deberían conducir o utilizar máquinas.</p> <p>Prospecto: No es probable que X afecte a su capacidad para conducir o utilizar herramientas o máquinas. Pueden aparecer efectos adversos tales como mareo y alteraciones visuales (ver sección 4). Si ocurrieran, no debería conducir o utilizar máquinas.</p> <p>Texto aprobado por procedimiento centralizado</p>
	Lansoprazol		
	Omeprazol		
	Pantoprazol		
	Rabeprazol		
A02BX Otros fármacos para la úlcera péptica y el reflujo	Acexamato de zinc		
	Bismuto, <u>S</u> ubcitrato		
	Dosmalfato		
	Sucralfato		

Nota: Ver normas generales de interpretación de los listados (<http://www.aemps.es/indFarma/etiqueProspectos/conduccion/normasListados.htm>)