

LISTADO DE PRINCIPIOS ACTIVOS E INCORPORACIÓN DEL PICTOGRAMA DE LA CONDUCCIÓN.  
**Grupo C** - Sistema cardiovascular. Subgrupo C01 – Terapia cardiaca. Fecha de publicación 08.10.15. Versión 004

Eliminación del pictograma de la conducción del principio activo: Dronedarona a 8 de octubre de 2015.

SUBGRUPO	P. ACTIVOS	PICTOGRAMA	PROPUESTA REDACTADO
<b>C01A: GLUCOSIDOS CARDIOTONICOS</b>			
<b>C01AA</b> Glucosidos de digital	Digoxina	<b>No</b>	
	Metildigoxina		
<b>C01B: ANTIARRITMICOS</b>			
<b>C01BA</b> Clase IA	Disopiramida	<b>No</b>	<p><b>Ficha técnica (sección 4.7):</b>            Durante el tratamiento puede aparecer &lt;...reacciones adversas...&gt;, que habrán de tenerse en cuenta en caso de conducir o manejar máquinas peligrosas.</p> <p><b>Prospecto:</b>            Durante el tratamiento puede aparecer &lt;reacciones adversa...&gt;, por lo que si notase estos síntomas no deberá conducir automóviles ni manejar máquinas peligrosas.</p>
	Hidroquinidina		
	Procainamida		
	Quinidina		

Nota: Ver normas generales de interpretación de los listados (<http://www.aemps.gob.es/industria/etiquetado/conduccion/listadosPrincipios/normasListados.htm>)



LISTADO DE PRINCIPIOS ACTIVOS E INCORPORACIÓN DEL PICTOGRAMA DE LA CONDUCCIÓN.  
Grupo C - Sistema cardiovascular. Subgrupo C01 – Terapia cardíaca. Fecha de publicación 08.10.15. Versión 004



SUBGRUPO	P. ACTIVOS	PICTOGRAMA	PROPUESTA REDACTADO
<b>C01B: ANTIARRITMICOS</b>			
<b>C01BB</b> Clase IB	Fenitoína (cardio)	Sí	<b>Ficha Técnica (sección 4.7):</b> X actúa sobre el sistema nervioso central y puede producir: somnolencia, mareos, alteraciones visuales y disminución de la capacidad de reacción. Estos efectos así como la propia enfermedad hacen que sea recomendable tener precaución a la hora de conducir vehículos o manejar maquinaria peligrosa, especialmente mientras no se haya establecido la sensibilidad particular de cada paciente al medicamento. <b>Prospecto:</b> X puede producir síntomas tales como somnolencia, mareo o alteraciones en la vista, y disminuir la capacidad de reacción. Estos efectos así como la propia enfermedad pueden dificultar su capacidad para conducir vehículos o manejar máquinas. Por lo tanto no conduzca, ni maneje máquinas, ni practique otras actividades que requieran especial atención, hasta que su médico valore su respuesta a este medicamento.
	Lidocaína (cardio)	Sí	<b>Ficha Técnica (sección 4.7):</b> En función de la dosis y el lugar de administración, los anestésicos locales pueden afectar la función mental y alterar temporalmente la locomoción y la coordinación. Cuando se administre este medicamento el médico debe valorar en cada caso particular si la capacidad de reacción está comprometida y si el paciente puede conducir o utilizar máquinas. <b>Prospecto:</b> X puede alterar temporalmente su capacidad de movimiento, atención y coordinación. Su médico le indicará si puede conducir o utilizar máquinas.

Nota: Ver normas generales de interpretación de los listados (<http://www.aemps.gob.es/industria/etiquetado/conduccion/listadosPrincipios/normasListados.htm>)



LISTADO DE PRINCIPIOS ACTIVOS E INCORPORACIÓN DEL PICTOGRAMA DE LA CONDUCCIÓN.  
**Grupo C** - Sistema cardiovascular. Subgrupo C01 – Terapia cardíaca. Fecha de publicación 08.10.15. Versión 004



SUBGRUPO	P. ACTIVOS	PICTOGRAMA	PROPUESTA REDACTADO
<b>C01B: ANTIARRITMICOS</b>			
<b>C01BC</b> Clase IC	Flecainida	<b>No</b>	<b>Ficha técnica (sección 4.7):</b> Durante el tratamiento puede aparecer <reacciones adversas...>, que habrán de tenerse en cuenta en caso de conducir o manejar máquinas peligrosas.  <b>Prospecto:</b> Durante el tratamiento, pueden aparecer <reacciones adversas...>, por lo que si notase estos síntomas no deberá conducir automóviles ni manejar máquinas peligrosas.
	Propafenona		
<b>C01BD</b> Clase III	Amiodarona	<b>Sí</b>	<b>Ficha Técnica (sección 4.7):</b> X puede producir <...reacciones adversas...> u otros síntomas que pueden alterar la capacidad de conducción. Por lo tanto, se recomienda precaución en caso de conducir o manejar máquinas peligrosas.  <b>Prospecto:</b> X puede causar <...reacciones adversa...> u otros síntomas que pueden alterar la capacidad de conducción. Si nota alguno de estos efectos evite conducir vehículos o utilizar máquinas.
	Dronedarona	<b>No</b>	

Nota: Ver normas generales de interpretación de los listados (<http://www.aemps.gob.es/industria/etiquetado/conduccion/listadosPrincipios/normasListados.htm>)



LISTADO DE PRINCIPIOS ACTIVOS E INCORPORACIÓN DEL PICTOGRAMA DE LA CONDUCCIÓN.  
**Grupo C** - Sistema cardiovascular. Subgrupo C01 – Terapia cardíaca. Fecha de publicación 08.10.15. Versión 004



SUBGRUPO	P. ACTIVOS	PICTOGRAMA	PROPUESTA REDACTADO
<b>C01C: ESTIMULANTES CARDIACOS (excl. glucósidos)</b>			
<b>C01CA</b> Adrenérgicos y Dopaminérgicos	Dobutamina	<b>No</b>	
	Dopamina		
	Epinefrina		
	Etilefrina		
	Fenilefrina		
	Ibopamina		
	Isoprenalina		
	Metoxamina		
	Midodrina		
	Norepinefrina		
<b>C01CB</b> Inhibidores de fosfodiesterasa	Milrinona		
<b>C01CX</b> Otros estimulantes	Levosimendan		

Nota: Ver normas generales de interpretación de los listados (<http://www.aemps.gob.es/industria/etiquetado/conduccion/listadosPrincipios/normasListados.htm>)



LISTADO DE PRINCIPIOS ACTIVOS E INCORPORACIÓN DEL PICTOGRAMA DE LA CONDUCCIÓN.  
**Grupo C** - Sistema cardiovascular. Subgrupo C01 – Terapia cardíaca. Fecha de publicación 08.10.15. Versión 004



SUBGRUPO	P. ACTIVOS	PICTOGRAMA	PROPUESTA REDACTADO
<b>C01D: VASODILATADORES</b>			
<b>C01DA</b> Nitratos orgánicos	Isosorbida, dinitrato	<b>No</b>	<b>Ficha Técnica (sección 4.7):</b> X puede producir <...reacciones adversas...>, especialmente al inicio del tratamiento. Por lo tanto, se recomienda precaución en caso de conducir o manejar máquinas peligrosas.  <b>Prospecto:</b> X puede producir <...reacciones adversas...>, especialmente al inicio del tratamiento. Si nota alguno de estos efectos evite conducir vehículos o utilizar máquinas.
	Isosorbida, mononitrato		
	Nitroglicerina		
<b>C01DX</b> Otros vasodilatadores	Molsidomina	<b>No</b>	<b>Ficha Técnica (sección 4.7):</b> Al administrar X, tal como ocurre con otros medicamentos antihipertensivos, puede disminuir la capacidad para la conducción de vehículos o el manejo de máquinas, especialmente al inicio del tratamiento o si se toma alcohol simultáneamente.  <b>Prospecto:</b> X puede disminuir la capacidad de conducir o utilizar máquinas, especialmente al inicio del tratamiento o si se toma alcohol simultáneamente.
	Nicorandil		

Nota: Ver normas generales de interpretación de los listados (<http://www.aemps.gob.es/industria/etiquetado/conduccion/listadosPrincipios/normasListados.htm>)



LISTADO DE PRINCIPIOS ACTIVOS E INCORPORACIÓN DEL PICTOGRAMA DE LA CONDUCCIÓN.  
**Grupo C** - Sistema cardiovascular. Subgrupo C01 – Terapia cardíaca. Fecha de publicación 08.10.15. Versión 004



SUBGRUPO	P. ACTIVOS	PICTOGRAMA	PROPUESTA REDACTADO
<b>C01E: OTROS PREPARADOS PARA TERAPIA CARDIACA</b>			
<b>C01EA</b> Prostaglandinas	Alprostadilo (cardio)	<b>No</b>	
<b>C01EB</b> Otros, solos	Adenosina	<b>No</b>	
	Carnitina		
	Ibuprofeno (cardiología)		
	Icatibant		
	Indometacina (cardiología)		
	Ivabradina	<b>Sí</b>	
	Ranolazina	<b>No</b>	
	Trimetazidina		
Regadenoson			

Nota: Ver normas generales de interpretación de los listados (<http://www.aemps.gob.es/industria/etiquetado/conduccion/listadosPrincipios/normasListados.htm>)