



LISTADO DE PRINCIPIOS ACTIVOS E INCORPORACIÓN DEL PICTOGRAMA DE LA CONDUCCIÓN

Grupo C – Sistema cardiovascular. Subgrupo C03 – Diuréticos. Fecha de publicación 02.06.10. Versión 001

SUBGRUPO	P. ACTIVO	PICTOGRAMA	PROPUESTA REDACTADO
C03A: DIURÉTICOS DE TECHO BAJO: TIAZIDAS			
C03AA Tiazidas, monofármacos	Hidroclorotiazida	No	Ficha técnica (sección 4.7): Es poco probable que X afecte a la capacidad para conducir o utilizar máquinas. Sin embargo, como otros medicamentos antihipertensivos, X puede provocar mareos o somnolencia en algunas personas, especialmente al inicio del tratamiento, al cambiar de dosis o si se consume alcohol. Se debe advertir a los pacientes que reciben X de que no deben conducir ni manejar máquinas si presentan mareos o somnolencia. Prospecto: Es poco probable que X afecte a su capacidad para conducir o utilizar máquinas. Sin embargo, como otros medicamentos utilizados para tratar la presión arterial alta, X puede provocar mareos o somnolencia en algunas personas, especialmente al inicio del tratamiento, al cambiar de dosis o si se consume alcohol. Si experimenta mareos o somnolencia, consulte con su médico antes de realizar dichas actividades.
C03AX Tiazidas con otros fármacos	Hidroclorotiazida con concentrado enzimático	No	

Nota: Ver normas generales de interpretación de los listados (<http://www.aemps.es/indFarma/etiqueProspectos/conduccion/normasListados.htm>)

LISTADO DE PRINCIPIOS ACTIVOS E INCORPORACIÓN DEL PICTOGRAMA DE LA CONDUCCIÓN



Grupo C – Sistema cardiovascular. **Subgrupo C03** – Diuréticos. Fecha de publicación 02.06.10. Versión 001



SUBGRUPO	P. ACTIVO	PICTOGRAMA	PROPUESTA REDACTADO
C03B: DIURÉTICOS DE TECHO BAJO, EXCLUYENDO TIAZIDAS			
C03BA Sulfonamidas, monofármacos	Clortalidona	No	<p>Ficha técnica (sección 4.7): Es poco probable que X afecte a la capacidad para conducir o utilizar máquinas. Sin embargo, como otros medicamentos antihipertensivos, X puede provocar mareos o somnolencia en algunas personas, especialmente al inicio del tratamiento, al cambiar de dosis o si se consume alcohol. Se debe advertir a los pacientes que reciben X de que no deben conducir ni manejar máquinas si presentan mareos o somnolencia.</p> <p>Prospecto: Es poco probable que X afecte a su capacidad para conducir o utilizar máquinas. Sin embargo, como otros medicamentos utilizados para tratar la presión arterial alta, X puede provocar mareos o somnolencia en algunas personas, especialmente al inicio del tratamiento, al cambiar de dosis o si se consume alcohol. Si experimenta mareos o somnolencia, consulte con su médico antes de realizar dichas actividades.</p>
	Indapamida		
	Xipamida		

Nota: Ver normas generales de interpretación de los listados (<http://www.aemps.es/indFarma/etiqueProspectos/conduccion/normasListados.htm>)



LISTADO DE PRINCIPIOS ACTIVOS E INCORPORACIÓN DEL PICTOGRAMA DE LA CONDUCCIÓN

Grupo C – Sistema cardiovascular. Subgrupo C03 – Diuréticos. Fecha de publicación 02.06.10. Versión 001



SUBGRUPO	P. ACTIVO	PICTOGRAMA	PROPUESTA REDACTADO
C03C: DIURÉTICOS DE TECHO ALTO			
C03CA Sulfonamidas, monofármacos	Bumetanida	No	
	Furosemida	No	Ficha técnica (sección 4.7) Al igual que otros fármacos que modifican la tensión arterial, se debe advertir a los pacientes que reciben X de que no deben conducir ni manejar máquinas si presentan mareos o síntomas relacionados. Este hecho es especialmente importante al comienzo del tratamiento, cuando se aumente la dosis, se cambie el tratamiento o cuando se ingiera alcohol de forma concomitante. Prospecto: Este medicamento puede producir mareos o somnolencia. Esto puede ocurrirle con mayor frecuencia al inicio del tratamiento, cuando su médico le aumente la dosis o si consume alcohol. No conduzca ni maneje herramientas o máquinas si se siente mareado o somnoliento.
	Piretanida	No	
	Torasemida	No	Ficha técnica (sección 4.7) Al igual que otros fármacos que modifican la tensión arterial, se debe advertir a los pacientes que reciben torasemida de que no deben conducir ni manejar máquinas si presentan mareos o síntomas relacionados. Este hecho es especialmente importante al comienzo del tratamiento, cuando se aumente la dosis, se cambie el tratamiento o cuando se ingiera alcohol de forma concomitante. Prospecto: Este medicamento puede producir mareos o somnolencia. Esto puede ocurrirle con mayor frecuencia al inicio del tratamiento, cuando su médico le aumente la dosis o si consume alcohol. No conduzca ni maneje herramientas o máquinas si se siente mareado o somnoliento.

Nota: Ver normas generales de interpretación de los listados (<http://www.aemps.es/indFarma/etiqueProspectos/conduccion/normasListados.htm>)

LISTADO DE PRINCIPIOS ACTIVOS E INCORPORACIÓN DEL PICTOGRAMA DE LA CONDUCCIÓN



Grupo C – Sistema cardiovascular. **Subgrupo C03** – Diuréticos. Fecha de publicación 02.06.10. Versión 001



SUBGRUPO	P. ACTIVO	PICTOGRAMA	PROPUESTA REDACTADO
C03D: AGENTES AHORRADORES DE POTASIO			
C03DA Antagonistas de la aldosterona	Eplerenona	No	
	Espironolactona	No	<p>Ficha técnica (sección 4.7) Algunos pacientes han presentado somnolencia y mareo, especialmente al inicio del tratamiento, por lo que, se aconseja tener precaución a la hora de conducir vehículos, manejar maquinaria peligrosa o de precisión, así como realizar cualquier otra actividad que requiera concentración.</p> <p>Prospecto: X puede producir somnolencia y mareo, especialmente al inicio del tratamiento. Si observa dichos efectos, debe consultar al médico antes de realizar estas actividades. No maneje herramientas o máquinas si su habilidad para manejarlas resulta afectada por este medicamento</p>

Nota: Ver normas generales de interpretación de los listados (<http://www.aemps.es/indFarma/etiqueProspectos/conduccion/normasListados.htm>)



LISTADO DE PRINCIPIOS ACTIVOS E INCORPORACIÓN DEL PICTOGRAMA DE LA CONDUCCIÓN

Grupo C – Sistema cardiovascular. Subgrupo C03 – Diuréticos. Fecha de publicación 02.06.10. Versión 001



SUBGRUPO	P. ACTIVO	PICTOGRAMA	PROPUESTA REDACTADO
C03E: DIURÉTICOS Y AGENTES AHORRADORES DE POTASIO EN COMBINACIÓN			
C03EA Diuréticos de techo bajo con ahorradores de potasio	Hidroclorotiazida con Amilorida	Dependerá de los principios activos incluidos en la combinación	
	Bendroflumetiazida con Espironolactona		
	Altiazida con Espironolactona		
	Clortalidona con Espironolactona		
C03EB Diuréticos alto techo mas ahorradores de potasio	Furosemida con Triamtereno	Dependerá de los principios activos incluidos en la combinación	

Nota: Ver normas generales de interpretación de los listados (<http://www.aemps.es/indFarma/etiqueProspectos/conduccion/normasListados.htm>)