



## LISTADO DE PRINCIPIOS ACTIVOS E INCORPORACIÓN DEL PICTOGRAMA DE LA CONDUCCIÓN.

Grupo N - Sistema nervioso. Subgrupo N02 - Analgésicos. Fecha de publicación 02.06.10. Versión 001

SUBGRUPO	P. ACTIVOS	PICTOGRAMA	PROPUESTA REDACTADO
<b>N02A: OPIOIDES</b>			
<b>N02AA</b> Alcaloides naturales del opio	Dihidrocodeína	<b>Sí</b>	<p><b>Ficha Técnica (sección 4.7)</b> Los analgésicos opioides pueden disminuir la capacidad mental y/o física necesaria para realizar tareas potencialmente peligrosas (p.ej. conducir un coche o utilizar máquinas), especialmente &lt;al inicio del tratamiento&gt;, &lt;tras un aumento de la dosis&gt; &lt;tras un cambio de formulación&gt; y/o &lt;al administrarlo conjuntamente con otros medicamentos.&gt; Se debe advertir a los pacientes que no conduzcan ni utilicen máquinas si sienten somnolencia, mareo o alteraciones visuales mientras toman X, o hasta que se compruebe que la capacidad para realizar estas actividades no queda afectada.</p> <p><b>Prospecto</b> Pregunte a su médico si puede conducir o utilizar máquinas durante el tratamiento con X. Es importante que antes de conducir o utilizar máquinas, observe como le afecta este medicamento. No conduzca ni utilice maquinas si siente sueño, mareo, tiene visión borrosa o ve doble, o tiene dificultad para concentrarse. Tenga especial cuidado &lt;al inicio del tratamiento&gt;, &lt;tras un aumento de la dosis&gt;, &lt;tras un cambio de formulación.&gt; y/o &lt;al administrarlo conjuntamente con otros medicamentos.&gt;</p>
	Hidromorfona		
	Morfina		
	Oxicodona		
<b>N02AB</b> Derivados de fenilpiperidina	Fentanilo		
	Petidina		
<b>N02AC</b> Derivados de la difenilpropilamina	Dextropropoxifeno		
<b>N02AD</b> Derivados del benzomorfolano	Pentazocina		
<b>N02AE</b> Derivados de la oripavina	Buprenorfina		
<b>N02AF</b> Derivados del morfina	Nalbufina		
<b>N02AX</b> Otros opioides	Tramadol		

Nota: Ver normas generales de interpretación de los listados (<http://www.aemps.es/indFarma/etiqueProspectos/conduccion/normasListados.htm>)

CORREO ELECTRÓNICO

sdaem@aemps.es



## LISTADO DE PRINCIPIOS ACTIVOS E INCORPORACIÓN DEL PICTOGRAMA DE LA CONDUCCIÓN.

Grupo N - Sistema nervioso. Subgrupo N02 - Analgésicos. Fecha de publicación 02.06.10. Versión 001



SUBGRUPO	P. ACTIVOS	PICTOGRAMA	PROPUESTA REDACTADO
<b>N02B: OTROS ANALGÉSICOS Y ANTIPIRÉTICOS</b>			
<b>N02BA</b> Ácido salicílico y derivados	AAS	<b>No</b>	
	Etenzamida		
<b>N02BB</b> Pirazolonas	Fenazona		
	Metamizol	<b>Sí</b>	<b>Ficha Técnica (sección 4.7)</b> Aunque no son de esperar efectos adversos sobre la capacidad de concentración y de reacción, a las dosis más altas, dentro de las recomendadas, debe tenerse en cuenta que estas capacidades pueden verse afectadas y se debe evitar utilizar máquinas, conducir vehículos u otras actividades peligrosas. Esto es especialmente aplicable cuando se ha consumido alcohol.  <b>Prospecto</b> Aunque no son de esperar efectos adversos sobre la capacidad de concentración y de reacción, a las dosis más altas, dentro de las recomendadas, debe tenerse en cuenta que estas capacidades pueden verse afectadas y se debe evitar utilizar máquinas, conducir vehículos u otras actividades peligrosas. Esto es especialmente aplicable cuando se ha consumido alcohol.
	Propifenazona	Dependerá de los principios activos incluidos en la combinación	
<b>N02BE</b> Anilidas	Paracetamol	<b>No</b>	

Nota: Ver normas generales de interpretación de los listados (<http://www.aemps.es/indFarma/etiqueProspectos/conduccion/normasListados.htm>)



## LISTADO DE PRINCIPIOS ACTIVOS E INCORPORACIÓN DEL PICTOGRAMA DE LA CONDUCCIÓN.

Grupo N - Sistema nervioso. Subgrupo N02 - Analgésicos. Fecha de publicación 02.06.10. Versión 001



SUBGRUPO	P. ACTIVOS	PICTOGRAMA	PROPUESTA REDACTADO
<b>N02B: OTROS ANALGÉSICOS Y ANTIPIRÉTICOS</b>			
<b>N02BG</b> Otros analgésicos y antipiréticos	Clonixino lisina	<b>No</b>	
	Ziconotida	<b>Sí</b>	<b>Ficha Técnica (sección 4.7)</b> X puede provocar confusión, somnolencia, mareo y otras reacciones adversas neurológicas, por lo que se debe aconsejar a los pacientes que no conduzcan ni utilicen máquinas si notan algún efecto. <b>Prospecto</b> Se ha comunicado que el uso de X puede provocar confusión y somnolencia. Consulte con su médico antes de conducir o de utilizar maquinaria.

Nota: Ver normas generales de interpretación de los listados (<http://www.aemps.es/indFarma/etiqueProspectos/conduccion/normasListados.htm>)



## LISTADO DE PRINCIPIOS ACTIVOS E INCORPORACIÓN DEL PICTOGRAMA DE LA CONDUCCIÓN.

Grupo N - Sistema nervioso. Subgrupo N02 - Analgésicos. Fecha de publicación 02.06.10. Versión 001



SUBGRUPO	P. ACTIVOS	PICTOGRAMA	PROPUESTA REDACTADO
<b>N02C: PREPARADOS ANTIMIGRAÑOSOS</b>			
<b>N02CA</b> Alcaloides del cornezuelo	Dihidro ergotamina	<b>No</b>	<b>Ficha Técnica (sección 4.7)</b> Debe tenerse en cuenta que algunos síntomas, como somnolencia, mareos y debilidad, causados por la propia crisis migrañosa, pueden afectar a la capacidad para conducir o utilizar máquinas.
	Ergotamina		<b>Prospecto</b> Este medicamento puede producir mareos. Debe tener en cuenta que algunos síntomas, como somnolencia, mareos y debilidad, causados por la propia crisis migrañosa, pueden afectar a la capacidad para conducir o utilizar máquinas.
<b>N02CC</b> Agonistas selectivos de serotonina (5-HT <sub>1</sub> )	Almotriptan	<b>Sí</b>	<b>Ficha Técnica (sección 4.7)</b> La migraña o el tratamiento con X pueden producir somnolencia. Se debe recomendar a los pacientes que valoren su capacidad para realizar tareas complejas, tales como conducir, durante las crisis de migraña y tras la administración de X.  <b>Prospecto</b> Este medicamento al igual que la migraña puede causar somnolencia. Si nota estos efectos evite conducir o utilizar máquinas ya que puede ser peligroso.
	Eletriptan		
	Frovatriptan		
	Naratriptan		
	Rizatriptan		
	Sumatriptan		
Zolmitriptan			
<b>N02CX</b> Otros preparados antimigrañosos	Pizotifeno	<b>Sí</b>	

Nota: Ver normas generales de interpretación de los listados (<http://www.aemps.es/indFarma/etiqueProspectos/conduccion/normasListados.htm>)