

**Tarjeta de alerta para el paciente en tratamiento con Remicade**

Esta tarjeta de alerta contiene información importante de seguridad que necesita conocer antes de administrarle Remicade y durante el tratamiento con Remicade.

- Muestre esta tarjeta a los médicos que le estén llevando el tratamiento.

**Infecciones**

Remicade aumenta el riesgo de contraer infecciones. Las infecciones pueden progresar más rápidamente, y ser más graves. Esto incluye a la tuberculosis (TB).

- No debe ser tratado con Remicade si tiene una infección grave.
- Debe someterse a las pruebas de TB antes del tratamiento con Remicade. Es muy importante que le diga a su médico si tuvo alguna vez TB, o si ha estado en contacto con alguien que haya tenido TB. Por favor registre las fechas de las últimas pruebas de detección de TB aquí debajo:

Test de tuberculina: \_\_\_\_\_

Radiografía de tórax: \_\_\_\_\_

- Si tiene síntomas que sugieren infecciones, como fiebre, tos persistente, pérdida de peso, o cansancio, debe ponerse en contacto con su médico inmediatamente.

**Insuficiencia cardíaca**

- Remicade no debe utilizarse si tiene insuficiencia cardíaca moderada o grave.
- Si tiene síntomas de insuficiencia cardíaca (dificultad al respirar o hinchazón de los pies), debe ponerse en contacto con su médico inmediatamente.

**Fechas del tratamiento con Remicade:**

Inicio: \_\_\_\_\_

Último tratamiento: \_\_\_\_\_

- Para más información, lea el prospecto de Remicade.
- Cuando vaya al médico, asegúrese de llevar anotados todos los demás medicamentos que esté tomando.

Nombre del paciente: \_\_\_\_\_

Nombre del médico: \_\_\_\_\_

Teléfono del médico: \_\_\_\_\_

- Guarde esta tarjeta durante 6 meses desde la última dosis de Remicade, ya que las reacciones adversas pueden aparecer un tiempo después de la última dosis de Remicade.