

ENANGEL®, KETESGEL®, QUIRGEL®
(gel de dexketoprofeno)

**INFORMACIÓN A TENER EN CUENTA POR EL PRESCRIPTOR
SOBRE REACCIONES DE FOTOSENSIBILIDAD**

Apreciado Doctor:

Las reacciones de fotosensibilidad de medicamentos con dexketoprofeno de uso tópico son reacciones adversas importantes pero el balance beneficio/riesgo de éstos sigue siendo favorable.

Deben aplicarse algunas medidas de minimización de riesgo de reacciones de fotosensibilidad con respecto a medicamentos con dexketoprofeno de administración tópica, a fin de garantizar un uso más seguro de los mismos. Por otra parte, estos medicamentos sólo deben poder obtenerse con receta médica.

Entre estas medidas de minimización de riesgo, le proporcionamos la siguiente lista de aspectos a tener en cuenta para ayudarle a verificar la ausencia de contraindicaciones relacionadas con fototoxicidad y fotoalergia al prescribir Enangel, Kestegel o Quirgel (dexketoprofeno en forma tópica). **Tras haber explicado al paciente las medidas preventivas que debe seguir, compruebe que ha comprendido los aspectos relativos al riesgo de fotosensibilidad y que adoptará las precauciones deseadas para cumplir dichas medidas.**

**CONTRAINDICACIONES RELACIONADAS CON LA FOTOTOXICIDAD Y LA FOTOALERGIA
DE ENANGEL, KETESGEL Y QUIRGEL**

Antes de prescribir Enangel, Kestegel o Quirgel, debe **asegurarse de que el paciente cumple las condiciones siguientes:**

- **No presenta historial de reacción de fotosensibilidad.**
- **No presenta historial de alergia cutánea a dexketoprofeno o ketoprofeno en forma tópica, ácido tiaprofénico, fenofibrato o protectores de UV (particularmente los que contienen octocrileno) o a perfumes.**
- **No presenta reacciones de hipersensibilidad conocidas tales como síntomas de asma o rinitis alérgica a dexketoprofeno, ketoprofeno, ácido tiaprofénico, ácido acetilsalicílico o a otros medicamentos antiinflamatorios no esteroideos (AINE).**

MEDIDAS PREVENTIVAS **DE REACCIONES DE FOTOSENSIBILIDAD**

Es importante explicar al paciente las siguientes medidas preventivas:

- **«No exponga las zonas tratadas al sol (incluso en días nublados), o a luz de aparatos de UV y, cuando esté en el exterior, proteja dichas zonas con ropa. Así debe ser durante el tratamiento y hasta pasadas dos semanas de la interrupción del mismo.»**
- «No utilice el gel bajo vendajes oclusivos».
- **«Lávese bien las manos tras cada aplicación del medicamento.»**
- «Limite la duración del tratamiento a una semana.»
- **«Deje de utilizar Enangel, Kestegel o Quirgel inmediatamente si sufre cualquier reacción en la piel,** incluso reacciones que se produzcan tras la aplicación conjunta con productos que contengan octocrileno. El octocrileno es un excipiente utilizado en diversos productos cosméticos y de higiene (por ejemplo protectores solares, champús, masajes para después del afeitado, geles de baño y ducha, cremas para la piel, cremas antiedad, desmaquilladores, sprays para el cabello) a fin de retrasar la fotodegradación del producto.»

Se encuentra a su disposición un folleto informativo para el paciente a este respecto. Puede solicitar ejemplares en:

Menarini S.A (Enangel®):
Tel. +34 93 462 88 00. Ext. 8340
mvalero@menarini.es

Merck S.L. (Kestesgel®):
Tel. +34 91 745 44 00
drug.safety.spain@merckserono.net

Juste S.A.Q.F. (Quirgel®):
Tel. +34 91 724 82 56
farmacovigilancia@juste.net