

EXTRAPLUS GEL[®], FASTUM GEL[®]
(gel de ketoprofeno)

**INFORMACIÓN ESPECÍFICA PARA EL PACIENTE SOBRE REACCIONES
FOTOALÉRGICAS**

Su médico le ha prescrito este medicamento. A continuación le recordamos algunos aspectos sobre las precauciones que deben tomarse respecto a las posibles reacciones de fotoalergia mientras lo esté utilizando:

La exposición al sol (incluso en días nublados) o a la luz de los aparatos de rayos UV en zonas tratadas con fórmulas tópicas de ketoprofeno puede originar reacciones en la piel potencialmente graves (debidas a la fotosensibilización, es decir una reacción alérgica por el efecto de la luz solar), aunque su aparición es poco frecuente. Éstas pueden incluir reacciones severas de eccemas que pueden extenderse o generalizarse. También pueden producirse otras reacciones alérgicas en la piel. El componente activo de Extraplus gel y Fastum gel es ketoprofeno, un antiinflamatorio.

Así pues, deben respetarse las siguientes recomendaciones antes, durante el uso y hasta 2 semanas después de la interrupción del tratamiento con Extraplus gel o Fastum gel:

- **No utilice Extraplus gel ni Fastum gel si tiene o ha tenido alguna alergia a ketoprofeno en forma tópica (principio activo de Extraplus gel y Fastum gel) o a otros componentes tales como el ácido tiaprofénico, el fenofibrato, los protectores UV (protectores solares, concretamente los que contienen octocrileno) o perfumes.**
- **No exponga las zonas tratadas con Extraplus gel o Fastum gel a la luz del sol (incluso en los días nublados) o a la luz de los aparatos de rayos UV y, cuando esté en el exterior, proteja con ropa estas zonas. Debe ser así durante el tratamiento y hasta 2 semanas después de su interrupción.**
- No utilice Extraplus gel ni Fastum gel bajo vendajes oclusivos
- **Lávese bien las manos tras cada aplicación de Extraplus gel o Fastum gel.**
- Limite la duración del tratamiento con Extraplus gel y Fastum gel a una semana.
- **Deje de utilizar Extraplus gel o Fastum gel inmediatamente si sufre cualquier reacción en la piel, incluso reacciones tras la coaplicación de productos que contengan octocrileno. El octocrileno es un excipiente utilizado en diversos productos cosméticos y de higiene (por ejemplo, protectores solares, champús, masajes para después del afeitado, geles de baño y ducha, cremas para la piel, lápiz de labios, cremas antiedad, desmaquilladores y sprays para el cabello) a fin de retrasar la fotodegradación.**

Si precisa más información, consulte con su médico o con su farmacéutico y el prospecto del medicamento

RECUERDE:

- **No utilice Extraplus gel o Fastum gel si tiene o ha tenido anteriormente alguna alergia con estos medicamentos**
- **Durante el tratamiento con estos medicamentos y hasta dos semanas después de finalizarlo:**
 - **No exponga las zonas tratadas con Extraplus gel o Fastum gel a la luz del sol (incluso en los días nublados) o a la luz de los aparatos de rayos UV**
 - **cuando esté en el exterior, proteja con ropa estas zonas**
- **Lávese bien las manos tras cada aplicación de Extraplus gel o Fastum gel.**
- **Deje de utilizar Extraplus gel o Fastum gel inmediatamente si sufre cualquier reacción en la piel.**