

ALERGIA AL LÁTEX COMO REACCIÓN ADVERSA A FÁRMACOS

E García Arnal, B Gómez Fontanillas, F Pérez-Moro Rodríguez
Asociación Española de Alérgicos a Alimentos y Látex. Institut Català de la Salut. Hospital Comarcal de la Selva

OBJETIVO. El látex de caucho natural es la sustancia lechosa que se extrae del árbol del caucho (*Hevea Brasiliensis*) y que, adecuadamente procesada, permite la elaboración de múltiples productos de uso cotidiano y sanitario. En el ámbito sanitario encontramos látex en material médico (guantes, sondas, esparadrapos, conexiones de sueros, compresores, ambú, vendajes elásticos, apósitos, etc.) y también en presentaciones farmacéuticas (protectores y émbolos de jeringas precargadas, tapones de viales, etc.) Es conocido el alto poder sensibilizante del látex y hay bibliografía extensa que recoge casos graves de anafilaxia debidos a su uso en procesos médicos y quirúrgicos. A menudo se menosprecia la repercusión que puede tener la administración de medicación contenida en envases con látex a personas sensibilizadas. Pretendemos alertar sobre las reacciones alérgicas que pueden derivarse de ésta.

MÉTODO. Se ha hecho una búsqueda bibliográfica de reacciones alérgicas tras la administración de una medicación contenida en envases con látex. Se ha consultado la normativa europea vigente sobre el etiquetado de productos medicinales de uso humano y también de la FDA. Se ha hecho una recopilación de fármacos actualmente disponibles en España que contienen látex en su presentación.

RESULTADO. Se han documentado abundantes casos de reacción adversa por alergia al látex contenido en el envase de la medicación. La norma europea obliga a etiquetar el contenido en látex de cualquier medicación de uso humano por la posibilidad de desencadenar reacciones alérgicas aunque hay confusión en la interpretación de la misma; incluso el contacto directo con los laboratorios no siempre proporciona toda la información necesaria. Diversas sociedades científicas advierten del peligro de administrar medicación cuya presentación contiene látex a alérgicos severos a éste. Ante la inexistencia de un protocolo claro, cada profesional busca la solución a su paciente alérgico al látex.

CONCLUSIONES. Hay que considerar la posible reacción alérgica al látex ante una reacción adversa farmacológica en un preparado cuyo envase contiene látex. Es importante documentar dichas reacciones y también difundir y clarificar la directriz europea que regula el etiquetado de estos medicamentos.