

EFFECTOS DE LAS MEDIDAS DE GESTIÓN DE LOS RIESGOS DE RISPERIDONA Y OLANZAPINA EN ANCIANOS CON DEMENCIA SOBRE EL CONSUMO DE ANTIPSICÓTICOS ATÍPICOS

MA Maciá Martínez, AM Martín Fernández-Gallardo

Área de Farmacia. Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM). Toledo

OBJETIVO. En marzo y mayo de 2004, la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) comunicaba a los profesionales sanitarios nuevos datos de seguridad, relativos a un incremento del riesgo de isquemia cerebral en ancianos con psicosis o trastornos de conducta asociados a demencia tratados con olanzapina o risperidona. Como consecuencia, se restringieron las condiciones de uso de risperidona, único antipsicótico atípico con esta indicación autorizada. El objetivo de este estudio es describir y analizar los efectos de las medidas de gestión de riesgos realizadas sobre el consumo de los antipsicóticos atípicos.

MÉTODOS. Consumo (Base DIGITALIS del SESCAM) de antipsicóticos atípicos vía oral. Su uso en las indicaciones objeto de las acciones reguladoras, se han delimitado por: 1. El % de consumo de especialidades de "Dosis Bajas" (DB): que tendrían (Ficha Técnica, Dosis Diaria Definida -DDD-, literatura médica) un uso limitado en esquizofrenia o trastorno bipolar, mientras que sí se adaptarían a su utilización en pacientes con demencia. 2. El % del consumo de cada fármaco en >74 años: considerando el % de esquizofrénicos mayores de esta edad (<5-6%), y la comparación con los % hallados para clozapina o amisulprida (1-5%).

RESULTADOS. Evolución del consumo antes y después (my-jn 2004) de las Notas Informativas de la AEMPS:

Fármacos	% envases en pacientes > 74años (respecto total de cada p. activo)				% envases de DB (respecto total principio activo)				mg de la DB	nº DB /día	DDD (mg)
	2002	2003	en-ab04	my-jn04	2002	2003	en-ab04	my-jn04			
Clozapina	0,7	1,5	2,4	2,1	5	5	5	5	25	1-2	300
Risperidona	41,4	43,0	44,3	44,1	49	48	49	48	1	1-2	5
Olanzapina	19,4	23,6	24,8	22,2	66	66	66	66	2,5-5	1	10
Quetiapina	17,6	26,6	24,2	33,1	66	68	71	76	25-100	2	400
Ziprasidona	-	22,5	23,7	30,3	-	30	40	47	20	2	80
Amisulprida	4,6	3,1	2,3	3,2	-	-	-	-	-	-	400

CONCLUSIONES. 1. Los datos obtenidos en el SESCAM indicarían que una relevante proporción de los tratamientos con risperidona, olanzapina, quetiapina y ziprasidona corresponden a >74 años que reciben dosis compatibles con su uso en ancianos con demencia. En los tres últimos fármacos, este perfil de uso, no autorizado y sin estudios clínicos que avalen su eficacia y seguridad, ha aumentado los últimos años. 2. El comportamiento del consumo de los antipsicóticos atípicos tras las medidas de comunicación de riesgos, estaría indicando un desplazamiento de la prescripción de risperidona y olanzapina (los que motivaron las medidas tomadas), hacia quetiapina y ziprasidona, de comercialización más reciente.