

SEGUIMIENTO EN OFICINAS DE FARMACIA DE LA UTILIZACIÓN DE FÁRMACOS INHIBIDORES SELECTIVOS DE LA CICLOOXIGENASA 2

C Navarro Pemán, J Lanuza Giménez, M García Caudevilla, MI Higuera Aranda, M Bartolomé Rodríguez

Centro de Farmacovigilancia de Aragón. Colegio Oficial de Farmacéuticos de Zaragoza. Departamento de Farmacología-Facultad de Medicina de Zaragoza

OBJETIVO. Evaluar el perfil de utilización y seguridad de los inhibidores de la ciclooxigenasa 2.

MÉTODO. Estudio postautorización observacional de seguimiento prospectivo (CFV-CEL-2003-01). Entre marzo y junio de 2003, se incluyeron, previo consentimiento, 214 pacientes que acudieron a la oficina de farmacia (53 de las tres provincias aragonesas) con una prescripción de celecoxib o rofecoxib.

RESULTADOS. La edad media de los pacientes fue $64,73 \pm 13,80$ años, con un 62% de mujeres. El medicamento más utilizado fue Celebrex (59,8%), seguido de Vioxx (33,6%) y Ceoxx (6,5%). Las pautas posológicas seguidas se ajustan, en su mayoría, a las recomendadas. No obstante, han aparecido desviaciones importantes tanto en la dosis diaria como en el intervalo de administración. Se ha detectado su utilización en indicaciones no autorizadas (19,9%). Se observa una significativa mayor utilización de rofecoxib en atención especializada ($p < 0,001$). En un 53,2% de los casos se utilizan de forma conjunta con protectores gástricos, incluso en pacientes sin antecedentes de patología gastrointestinal (40,1%). Se presentaron acontecimientos ligados a la prescripción (ALP) en un 54,2% de los pacientes, la mayoría de carácter leve (76,5%), no existiendo diferencias significativas en su perfil orgánico entre ambos principios activos. Del total de ALP, el 30,6% afectaban principalmente al aparato digestivo. De forma general el cumplimiento ha sido bueno (85,9%) y los pacientes valoran positivamente (77,3%) este grupo de fármacos en relación con otros tratamientos anteriores para la artrosis o la artritis reumatoide.

CONCLUSIONES. A pesar de las medidas administrativas adoptadas, se continúan detectando sesgos en la utilización de este grupo de fármacos, tanto en la pauta posológica seguida como en su uso para indicaciones terapéuticas no autorizadas. Los acontecimientos adversos a nivel gastrointestinal, siguen siendo los más frecuentes con este grupo de fármacos, como ocurre con el resto de AINEs. El seguimiento de fármacos en oficinas de farmacia es un método útil para estudiar las condiciones y contexto real de utilización de los medicamentos y permite obtener un perfil de seguridad del fármaco más completo.